



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Dine rettigheter ved yrkesrelatert blodsmitte


Kristin Planting Mølmann

Bedriftslege UNN HF

Nord Norsk seminar

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere

14.04.18



Aktuelle smittsomme sykdommer ved stikkskader

- Hepatitt B (30%)
- Hepatitt C (3%)
- HIV (0,3%)

Hvordan forebygge blodsmitte?

- Unngå stikkskader
- Være vaksinert mot Hepatitt B
- Kjenne til hvordan man får ø-hjelp når skaden har skjedd

Hvordan unngå stikkskader?

- Opplæring i hvordan man utfører prosedyrer for å minimere fare stikk, kutt og sprut
- Opplæring i trygg håndtering av utstyr med stikkende og skjærende egenskaper
- Hva betyr dette i praksis?

Nøytral sone

- Sterilt pussbekken el benyttes for overlevering av skjærende og stikkende utstyr istedenfor at utstyr leveres fra hånd til hånd

Kanylebokser

- Kanylebokser bør være en del av "plukklisten"
- Skjærende og stikkende engangsutstyr kastes umiddelbart i kanylebokser
- Ha boksene så nær brukerstedet som mulig.
- Fyll boksene bare $\frac{3}{4}$ fulle og forsegl dem før transport

Kanyler

- I de tilfeller det fins kanyler med beskyttelsesmekanismer på markedet, skal disse velges. Dette er lovpålagt.
- Ikke sett beskyttelseshefter tilbake på brukte kanyler.
- Ikke fjern brukte kanyler fra sprøyter.
- Ikke bryt og bøy kanyler.

Kulturen på operasjonsstua

- God kommunikasjon mellom alle aktører som er tilstedet under operasjonen
- Bevare roen
- Sørg for godt samarbeidsklima
- Ha god oversikt over utstyret

Når uhellet er ute...

- **Ved søl av blod i åpne sår, stikk eller kutt**
- La det blø. Ikke provoser frem blødning hvis det ikke blør
- Vask rikelig med såpe og vann
- Desinfiser med desinfeksjonssprit 70% / klorhexidin 5mg/ml i 3-4 min
- **Ved blodsprut i øyne, nese eller munn**
- Skyll rikelig med vann / fysiologisk saltvann
- Skyll evt munn med hydrogenperoxid 3%; 5ml i et glass vann i 3-4 min

Hepatitt B positiv smittekilde

- Hepatitt B immunglobuliner snarest mulig og helst innen 48 timer
- Vaksine

HIV-positiv smittekilde

- Profylakse raskest mulig og helst innen 4-48 timer
- Behandling pågår i 28 dager

Hepatitt C positiv smittekilde

- Ingen forebyggende behandling men behandling ved påvist sykdom

Kronisk smitteførende Hepatitt B, Hepatitt C eller HIV

Hva nå?

Rettigheter ved yrkessykdom

- Arbeidstakerrettigheter
- Forsikring vi NAV og arbeidsgiver

Arbeidstakerrettigheter

- Dersom man har smittsom blodsykdom kan det føre til visse arbeidsrestriksjoner av hensyn til pasientsikkerheten
- Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året arbeidstaker er sykemeldt
- Ved yrkessykdom strekker arbeidsgivers plikt til tilrettelegging om omplassering seg lenger enn ved annen type sykdom

Yrkesskedeforsikring

- Arbeidstaker er dekket av forsikringsordning via NAV og arbeidsgivers private forsikring
- Utgifter til behandling av yrkesskade dekkes av forsikringen
- Dersom sykdommen medfører inntektstap dekkes dette av forsikringen

Ervervsmessig uførhet

- Ved ervervsmessig uførhet på 100% settes erstatningssummen til 15G
- Erstatningssummen reduseres ved lavere uførhet

Medisinsk invaliditet

- Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:
 - 15-29%: 1G
 - 30-70%: 2G
 - >70% : 3G
- Dette utbetales årlig eller som engangssum etter eget ønske

Oppsummering

- Dersom man blir smittet av Hepatitt, HIV eller annen sykdom på jobb er man dekket av yrkesskedeforsikring via NAV og arbeidsgivers forsikring.
- Dette vil blant annet dekke utgifter til behandling og evt inntektstap
- Det å ha smittsom sykdom vil kunne gi visse arbeidsrestriksjoner av hensyn til pasientsikkerheten

Oppsummering

- Ved yrkessykdom strekker arbeidsgivers plikt til tilrettelegging om omplassering seg lenger enn ved annen type sykdom

Takk for oppmerksomheten 😊